BELLIS®

– НАДЕЖНОСТЬ, ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДО И ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

Холодная весна, затяжное цветение и перепады температур летом постоянно держат растения в стрессе. Ослабленные стрессами плодовые насаждения больше всего подвержены заболеваниям, и это приводит к снижению урожайности на распространенных сортах. Неустойчивые климатические условия вызывают в регионах выпадение большого количества осадков с градом, которые уничтожают урожай. Но мало вырастить и собрать, нужно сохранить, чтобы иметь максимальную выгоду от этого процесса: хороший товар имеет хорошую цену в период хранения. Благоприятный результат состоит из комплекса мероприятий: обрезка и уход в период покоя, сбалансированное минеральное питание, орошение и защита от болезней в период вегетации. Поэтому, когда мы говорим о защите плодовых, необходимо помнить не только об основных заболеваниях, проявляющихся во время развития плодов, а учитывать и те, которые влияют на качество и хранение урожая.

Bellis® является якорем в защите яблони и груши. Препарат компании BASF – это решение против основных грибковых болезней семечковых – мучнистой росы, гнилей и грибковых заболеваний, распространяющихся после сбора урожая, обладает мощным действием на альтернариоз яблони. Имеет как профилактическое, так и лечебное действие против патогенов.

Являясь универсальным продуктом, **Bellis®** решает множество проблем садовода и надежно оберегает плоды от заболеваний. BASF рекомендует проводить обработку садов, если возникает проблема с мучнистой росой в следующие фазы развития:
«Розовый бутон» – против мучнистой росы следует применять фунгицид **Bellis® нормой 0,8 кг/га**.
«Конец цветения» – препарат борется с мучнистой росой и альтернариозом. Для лучшего контроля и расширения спектра действия рекомендуется применять в комбинации с фунгицидом **Malakite®**.

«ГРАДОБОЙ»

«Градобой» – применение **Bellis®** после града локализует возбудителя болезни и препятствует его распространению. **Bellis®** обеспечивает быстрое затягивание ранок, вызванных механическим путем.

Если мы должны защитить будущий урожай от проблем с болезнями хранения, то обработку фунгицидом **Bellis® с нормой 0,8 – 1,0 кг/га** следует проводить в фазу *«формирование и созревание плодов»*, примерно **за 15 дней до сбора урожая**.
Максимальное количество обработок за сезон этим препаратом – три, но не более двух в прямой последовательности.

Высокая эффективность действия препарата Bellis® базируется на синергизме действующих веществ (**боскалид** и **пираклостробин**), принадлежащих к различным химическим классам: карбоксианилиды (глубокое системное действие) и стробилурины (трансламинарное, контактное, мезо-системное действие). Действующие вещества предотвращают прорастание спор, рост мицелия патогена и дальнейшее спорообразование. Это в свою очередь также предотвращает возникновение резистентности у патогенов к препарату.
Основным фактором снижения периода хранения свежих плодов яблони в зимне-весенний период является развитие болезни при длительном хранении различного происхождения.